

Anlage zur Pressemitteilung Nr. 66/2009

© 2009 Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht

Jahr	Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe als Kältemittel in Niedersachsen							
	insgesamt	davon			insgesamt	davon		
		ozonschicht-schädigende Stoffe ¹⁾	H-FKW	Blends		ozonschicht-schädigende Stoffe ¹⁾	H-FKW	Blends
	in metrischen Tonnen				Treibhauspotential (in 1000 Tonnen CO ₂ -Äquivalente)			
1996	736	278	398	61	1 588	847	520	221
1997	710	194	434	82	1 370	531	570	271
1998	869	209	548	113	1 460	386	726	348
1999	701	174	400	128	1 223	304	534	385
2000	974	134	683	157	1 605	230	894	481
2001	1 022	158	697	168	1 696	269	919	507
2002	929	139	584	207	1 616	233	766	618
2003	1 036	154	683	199	1 779	259	902	617
2004	1 045	132	906	206	1 709	211	940	558
2005	.	.	.	.	.	.	.	.
2006	993	.	721	272	1 662	.	947	715
2007	1 010	.	714	297	1 692	.	935	757
2008	1 250	.	923	328	2 024	.	1 206	818

1) Gemäß Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, z. B. voll- und teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, H-FCKW), Halone, Methylbromid, teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe (H-FBKW); diese Stoffe wurden ab 2006 nicht mehr statistisch erhoben.

Quelle: Erhebung bestimmter klimawirksamer Stoffe gemäß § 10 Abs. 1 Umweltstatistikgesetz (2005)

